

Aus dem Hygienischen Institut der Universität München
(Direktor: Geh. Rat Professor Dr. Kiskalt.)

**Berufsgefährdung bei Arbeitern
einer Tuchfabrik und Schneiderei**
unter besonderer Berücksichtigung
der Zähne und der Mundhöhle.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde

der Hohen Medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Regina Voss

Zahnärztin aus Bonn.

1 9 3 7



Meinen Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Das Hygienische Institut stellte mir die Aufgabe, die Gesundheitsverhältnisse der weiblichen Belegschaft der Lodenfabrik Frey in München unter besonderer Berücksichtigung der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten zu untersuchen.

Die Firma Loden-Frey beschäftigt in der Hauptsache weibliche Arbeitskräfte. Ich habe 310 Arbeiterinnen untersucht aus folgenden Abteilungen:

I. Tucherei mit den Unterabteilungen:

a) Kremperei:	13
b) Spinnerei	22
c) Weberei	39
d) Zettlerei	8

II. Schneiderei: 228

insgesamt	<u>310</u>
-----------	------------

Zunächst einige Zahlen, die uns Aufschluß geben, über die zurzeit in der Textilindustrie und dem Bekleidungsgewerbe beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Zählung 1933 ergab: Gesamtzahl der Erwerbspersonen in der Textilindustrie: 1 118 000 = 3,5% der Reichszahl.

Arbeiter: 936 000, davon sind weibliche Personen: 52,3%. In der Wollindustrie sind davon beschäftigt: 164 567.

Gesamtzahl der Erwerbspersonen in der Bekleidungsindustrie: 1 477 000 = 4,6% der Reichszahl.

Arbeiter: 893 000, davon sind weibliche Personen 53%. In der Schneiderei sind davon beschäftigt: 498 223 Personen.

Wir sehen, daß gerade in diesen beiden Berufsarten über 50% weibliche Personen beschäftigt sind.

Zunächst mag das daher kommen, daß die in den beiden Gewerben verlangte Arbeit der Frau besonders liegt, dann aber auch

daher, daß die Arbeit körperlich leicht ist. Die Hauptarbeit wird von Maschinen geleistet. So erstreckt sich die Arbeit in der Hauptsache auf das Überwachen der Maschinen und des Arbeitsvorganges. Erforderlich sind: Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit, gutes Beobachtungsvermögen und Flinkheit.

Der Arbeitsgang in der Tucherei.

Ich will nun kurz einen Überblick über den Arbeitsprozeß von der Rohwolle bis zum fertigen Stoff geben. Es handelt sich in diesem Falle um eine Wollspinnerei. Man unterscheidet zwei Verarbeitungsverfahren, und zwar, je nachdem ob Kammgarn oder Streichgarn verarbeitet wird, die Kamm- oder Streichgarnspinnerei.

Die Firma Loden-Frey stellt vorwiegend Lodenstoffe her. Unter Loden versteht man ein meliertes Gewebe aus Streichgarn. Das Streichgarn wird aus Streichwolle, die aus kurzen stark gekräuselten Schafwollfasern im Gegensatz zur langfaserigen glatten Kammwolle besteht, hergestellt. Einen kleinen Begriff von der Lodenfabrikation kann man sich machen, wenn man hört, daß in der Woche neben dem Stoff, der so zum Versand kommt, 1200—1300 Lodenmäntel angefertigt werden.

Die Rohwolle wird zunächst in einer besonderen Wollwaschmaschine, dem Leviathan, gewaschen, dann gefärbt und getrocknet.

Die vom Wollschweiß und Schmutz befreite Wolle wird durch den Wolf aufgelockert und entstaubt. Zur Erzielung der verschiedenen Farben wird sie gemischt. Die durch das Waschen entfettete Wolle wird geschmeidig gemacht durch Zusatz, früher von Olivenöl, heute einem chemischen Fett.

Von der Wolferei gelangt die aufgelockerte und eingefettete Wolle in die Kremperei. Ein Satz Krempel setzt sich zusammen aus dem:

Reißkrempel,
Pelzkrempel und
Spinnkrempel.

Im Reißkrepel wird die Wolle aufgearbeitet. Etwa zurückgebliebene Fremdkörper werden entfernt. Die Wollfasern werden durch Drahthäkchen, die auf einer Walze angebracht sind, geordnet, parallel gelegt und zu einem feinen Flor vereinigt. Ein dicker Pelz entsteht im Pelzkrepel, der im Feinkrepel in 1 cm breite Florstreifen zerlegt, dann zwischen Lederriemen, dem sogenannten Nitschelzeug in Quer- und Längsrichtung gerollt = genitschelt wird und als sogenanntes Vorgarn wenig gedreht, den Krepel verläßt.

Einige Frauen überwachen den glatten Ablauf des maschinellen Vorgangs.

Das Vorgarn wird in der Spinnerei auf Selfaktoren oder Ringspinnmaschinen zu einem festen Faden gedreht. Die Firma Loden-Frey arbeitet hauptsächlich mit Selfaktoren: Maschinen mit 400 bis 440 Spindeln, auf denen das Vorgarn von 1,20 m auf 1,60 m gestreckt und zu festem Garn gedreht wird.

In der Zwirnerei werden einige oder mehrere einzelne Fäden zu einem Faden, auch wieder maschinell zusammengedreht.

Zur Bedienung eines Selfaktors sind nur 2 Frauen notwendig. Sie gehen mit dem Wagen vor und zurück und verbinden abgerissene Fadenenden. Ebenso sorgen an der Ringspinnmaschine und der Zwirnmaschine wenige Arbeiterinnen für den glatten Ablauf des maschinellen Vorgangs.

Das Garn wird dann verarbeitet zu einem Gewebe rechtwinklig sich durchkreuzender Fäden: dem Tuch. Der längslaufende Faden, das Kettgarn, wird in bestimmter Zahl und Farbenfolge auf den 2 m breiten Kettbaum verteilt, gesichert und dann geleimt, damit der Faden glatt wird und bei der weiteren Verarbeitung nicht bricht, und schließlich getrocknet. Die Schlichte besteht aus einer Mischung von Stärke, Leim, Dextrin unter Zusatz von Kupfer, Zinkvitriol, Alaun und Glyzerin. Auch diese Arbeitsvorgänge werden nur von einigen Arbeiterinnen überwacht. Ihre Aufgabe ist, Fehler und Knotenbildung zu vermeiden und gleiche konische Auflagerung auf den Kettbaum zu überwachen.

Die Kettfäden werden in die Schäfte und in das Blatt eingezogen. Das Schußgarn kommt auf Spulen. Nun beginnt das eigentliche Weben auf Jacquardwebstühlen. Das Schußgarn wird in den Webschiffchen durch die angespannte Kette geschleudert. Die Kettfäden heben und senken sich mechanisch je nach Einstellung der Jacquardmaschine. Die Jacquardmaschine gibt die Bindung an und läßt sich verschieden einstellen. Die Stücke werden 50 Meter lang gewebt.

Während des eigentlichen Webvorganges fällt den die Webstühle bedienenden Arbeitern oder Arbeiterinnen, pro Stuhl 1 Person, die Aufgabe zu, Fehler durch Reißen des Fadens und Knotenbildung zu vermeiden und die Spulen zu erneuern. Das fertiggestellte Gewebe wird in der Zettlerei von einigen Frauen auf Fehler untersucht, genoppt, ausgenäht und ausgebeffert.

Es folgt der Karbonisationsprozeß in 2%iger Schwefelsäure. Dann werden die Stoffe gewalkt, um ein Verfilzen der Wollfasern zu erreichen, ferner gewaschen, geraucht, zur Beseitigung vorstehender Wollfaserenden geschoren und imprägniert. Schließlich werden sie zum Glätten durch Muldenpressen geführt, dekatiert und aufgerollt. Der Stoff ist nun fertig, entweder zum Versand oder zur Verarbeitung in den groß angelegten Schneiderwerkstätten der Firma Loden-Frey.

Der Arbeitsgang in der Schneiderei.

In der Schneiderei sind die meisten Arbeiterinnen beschäftigt. Es arbeiten in einem Saal etwa 80—100 Näherinnen und einige Büglerinnen. Die Stoffe werden zum Teil mit der Hand, zum Teil mit besonderen Zuschneidemaschinen zugeschnitten. Die Einrichterinne versehen den zugeschnittenen Stoff mit Futter, Zwirn, Knöpfen und sonstigen Zutaten. Jedes Stück wird nummeriert, damit keine Irrtümer vorkommen. Jede Schneiderin näht nur ein bestimmtes Teil. Die einzelnen Teile werden gebügelt, zum fertigen Kleidungsstück zusammengesetzt und kontrolliert. Sie werden dann im Ganzen gebügelt und nach nochmaliger Kontrolle versandt oder in den eigenen Verkaufsräumen verkauft.

Die Nähmaschinen werden elektrisch betrieben. Es wird fast alles mit der Maschine genäht, selbst Knopflöcher und zwar bis 2000 an einem Tage mit einer einzigen Maschine. Auch Knöpfe können mit einer Spezialmaschine befestigt werden. So entstehen in der Woche hunderte von Sakkos, Hosen und vor allem die bekannten Lodenmäntel.

Überblick über die Gesundheitsschädigungen, die in der Tucherei auftreten können.

Die Schädigungen, denen die Belegschaft ausgesetzt ist, ergeben sich aus dem Arbeitsmaterial, dessen Verarbeitung und der Arbeitsweise.

Das Arbeitsmaterial.

Verarbeitet wird Wolle, neuerdings untermischt mit Streckwolle. Bis zur Neuordnung innerhalb des Vierjahresplanes wurde verarbeitet: Ungarische Wolle, Kapwolle, Kamelhaar und Alpakka.

Die Schafwolle besteht zu rund zwei Dritteln aus Schweiß- und Schmutzbestandteilen. Nach *Lehmann* betragen die Verunreinigungen der Rohwolle 40—60%. Zur Herstellung des Streichgarns braucht man Streichwolle, die kurzfaferig und gekräuselt ist, im Gegensatz zur langfafrigen Kammwolle. *Koelsch* gibt als Länge der Wollfaser 36—250—550 mm an. Die Wollfasern sind mit feinen Schüppchen versehen, mit denen sie sich vor allem auf den Schleimhäuten festhaken. Sie sind so schwer durch die natürlichen Abwehrvorrichtungen des Organismus zu entfernen.

Einen Begriff über die Staubmengen, die während des Arbeitsganges entstehen, können wir uns nach den Angaben von *Joetten* machen. Er stellte fest: Im Batteursaal 8,6 mg, an verschiedenen Stellen der Weberei 10,2 mg und im Krempelsaal 12,4 mg Staub im cbm Luft. Man hat versucht die Staubentwicklung durch Exhaustoren, Ummantelung der Maschinen und besondere künstliche Ventilation einzuschränken. Doch wird sich gerade in der Textilindustrie die Staubbildung nie ganz vermeiden lassen.

Bei der hier in Frage kommenden Wollverarbeitung entsteht der meiste Staub beim Wollen und der Verarbeitung in der Krempelei und Weberei. Durch den Spinnvorgang wird verhältnismäßig wenig Staub hervorgerufen. Der animalische und vegetabilische Staub ist verhältnismäßig harmlos im Vergleich zum rein mineralischen Staub, der umso gesundheitschädlicher ist, je mehr Quarzteilchen, d. h. kristallinische Kieselsäure er enthält.

Bis in die Lungenalveolen gelangen im allgemeinen nur Teilchen bis zu $10\ \mu$, meist zwischen $0,5$ — $5\ \mu$ Größe. Demnach sind die hier auftretenden Staubteilchen meist zu groß, um in die Lunge vorzudringen und dort direkten Schaden anzurichten. Der Staub wird fast ausschließlich in den oberen Luftwegen aufgefangen und kann durch Reizung der Schleimhäute akute oder chronische Katarrhe der oberen Luftwege hervorrufen.

Der Organismus schützt sich vor Staub durch die Filterwirkung der Nase und durch Reflexe. Eine große Rolle in der Staubabwehr spielt die Filterwirkung der Nase. Sie hält nach *Koelsch* 50 % des einströmenden Luftstaubes gleich zurück. Die Reflexe, wie Niesen, Husten und das Intätigkeitssetzen des Flimmerepithels und der Staubzellen verhindern 25—40 % des eingeatmeten Staubes am weiteren Vordringen. So gelangen schließlich nur noch 10—25 % des Luftstaubes in die Lungenalveolen. Das Staubbindevermögen der Nase schwankt allerdings, wie Versuche von *Lehmann* zeigen, zwischen 5—80 %. Man macht diese Untersuchungsmethode zur Grundlage bei der Auswahl von Arbeitern, die gefährlichem Staub ausgesetzt sind. Mundatmer sind in solchen Berufen unbrauchbar. Die Grenze bewegt sich bei 30—40 % Filterwirkung der Nase.

Die Morphologie des Staubes ist von Bedeutung, weil die Staubteilchen verhältnismäßig groß sind und sich vorwiegend in den oberen Luftwegen festsetzen können. Hier handelt es sich aber, wie schon angegeben, in der Hauptsache um Tierfasern mit Schüppchen, die ähnlich wie Widerhaken wirken. Die Anwesenheit von Wasserdampf begünstigt die Staubresorption zunächst als Träger der Staubteilchen,

außerdem dadurch, daß er die Reflexe bedeutend abschwächt und so dem Staub ein tieferes Eindringen ermöglicht.

Schilling konnte auf Grund einer Untersuchung von 300 Spin-
nern mit Röntgenapparaten, selbst bei 30jähriger Berufstätigkeit
keine Staublungse feststellen. Wohl fand er eine erhöhte Disposition
zu akuten und chronischen Bronchialkatarrhen mit Lungenemphysem
als Folge. Bei 10jähriger Tätigkeit im Gewerbe stellte er oft chroni-
sche Bronchitis fest. Ferner berichtet er, daß bei einer Anzahl der von
ihm untersuchten Arbeiter katarrhalische Erscheinungen nach der
Arbeitschicht auftraten, die vor der Arbeit nicht vorhanden waren.

Koelsch weist außer auf die direkten Einwirkungen des Staubes
auch auf anaphylaktische Erscheinungen hin, die in Druck auf der
Brust, Atemnot und Husten sich äußern. Diese Symptome sollen her-
vorgerufen werden durch staubförmige, artfremde Eiweißkörper oder
durch Schimmelpilze. Ähnliche Symptome kennzeichnen den Weber-
husten.

Ergebnis der Nachfrage: Anaphylaktische Erscheinungen konnte
ich in der Tucherei in keinem Fall feststellen. Ich konnte keine nähe-
ren Untersuchungen über die Staubeinwirkung auf den Gesamtorga-
nismus anstellen. Nachfrage ergab, daß neun teils an akuter, teils
an chronischer Bronchitis leiden. Doch muß man bedenken, daß nicht
nur die Staubreizung, sondern auch das feucht-warme Arbeitsklima
Anlaß zu Bronchitis geben kann. Abgesehen von einigen Neuein-
stellungen sind die Arbeiterinnen fast alle schon Jahre lang bei der
Firma Loden-Frey tätig.

Weniger wesentlich, vor allem in Deutschland, sind Infektions-
krankheiten, die durch die Wolle verschleppt werden, wie Mykose,
Pocken und Milzbrand, der auch als Inhalationskrankheit, in Eng-
land „Wollfortierkrankheit“ genannt, auftritt, und da vor allem
durch Ziegenhaare von Ostindien, persische und ägyptische Wolle
hervorgerufen wird.

Eine Gefahr bildet die Wolle auch insofern, als sie leicht explo-
sibel ist, besonders dann, wenn sie zunächst in Benzin, Terpentinöl

oder Schwefelkohlenstoff gewaschen ist und dann wieder eingefettet wird. Das fein verteilte Öl nimmt Sauerstoff auf. Elektrische Funkenentladungen, Kurzschluß und heißgelaufene Maschinen können zu Explosionen führen. Doch sind meistens bautechnisch die notwendigen Sicherungen getroffen.

Die Verarbeitung.

Ein weiterer Faktor von schädigendem Einfluß ist das Arbeitsklima. Die Verarbeitung in den Spinn- und Webfälen erfordert einen hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft und eine bestimmte Temperatur. *Koelsch* gibt an, für Wolle 60—90% Feuchtigkeit und eine Temperatur von 21—25 Grad.

Das feucht-warme Arbeitsklima ist wesentlich. Es verhindert das Reißen des Fadens und dient zum Ausgleich für Spannungen, die sonst die feinen Fasern beim Spinnprozeß ablenken. Die Arbeiterinnen passen sich durch leichte Kleidung dem Arbeitsklima an. Meist tritt Gewöhnung ein. Es kann aber auch zu Störungen kommen, vor allem in der heißen Jahreszeit. Diese äußern sich als Hitzschlag, Ohnmacht, chronische Wärmestauungen, Kopfschmerzen, auf Grund von Verweichlichung in Erkältungskrankheiten und rheumatischen Krankheitserscheinungen. *Griesbach* fand in Baumwoll- und Kammgarntspinnereien über der Norm liegende Blutdruckwerte und Druckschwankungen, vor allem gegen Schluß der Arbeitszeit.

Schmid führt die bei Spinnereiarbeitern häufig beobachtete flache Atmung auf die schwüle Luft zurück. Rheumatische Erkrankungen sind besonders begünstigt in der Wollwäscherei und -färberei, in der Walkerei und im Karbonisationsraum. Die Leute sind dort ganz besonders Nässe und schwüler Temperatur ausgesetzt. Die chronische Wärmestauung begünstigt das Darniederliegen des Stoffwechsels.

In der Spinnerei, vor allem aber in der Weberei verursachen die Maschinen großen Lärm, der zu Gehörstörungen führen kann. In den Webfälen entstehen nach *Koelsch* 10—12 (alte) = 80—90 (neue) Phon. Auch hier findet meist Gewöhnung statt. Nur eine Arbeiterin fand ich, die ausgesprochen schwerhörig war.

Das Zerfetzen der Schlichte kann Ekzeme hervorrufen, außerdem Husten, Fieber und Asthmaanfälle, die zurückzuführen sind auf Schimmelpilze (*Aspergillus*), die sich auf dem fertigen Webstück bilden.

Die Arbeitsweise.

Ferner kann es zu Schädigungen durch die Arbeitsweise kommen. Die meiste Arbeit wird im Stehen verrichtet. Das viele Stehen begünstigt das Auftreten von Senkfüßen und Krampfadern. Es kann Bruchschäden veranlassen und zur Senkung von Bauch- und Beckenorganen führen. Die Seilfaktoren erfordern ein ständiges Hin- und Hergehen. Das Hinüberbeugen und Dehnen beim Anknüpfen eines gerissenen Fadens soll schädigend auf Bauch- und Beckenorgane wirken. Dauerndes Sitzen führt zu Stoffwechselstörungen. Es können auch Wirbelsäulenverkrümmungen auftreten in Verbindung mit Engbrüstigkeit und besonderer Tuberkulose-Empfänglichkeit.

Naharbeit kann Augenkrankheiten, vor allem Myopie, bedingen, besonders in der Zettlerei bei den Nopperinnen.

Ergebnis der Nachfrage.

19 der Untersuchten gaben an, Krampfadern zu haben. 18 klagten über Magen- und Darmstörungen und 2 über Sehfstörungen.

Unfälle.

Unfälle können durch die Transmissionen der einzelnen Maschinenten, durch unvorsichtiges Putzen der Maschinen während des Arbeitsganges, durch Überlaufen der Farbflotten, Staubexplosionen und durch Herausfliegen des Webschützen entstehen. Die Webstühle sind mit elastisch aufgehängten Schutzgittern versehen. Seitdem sind keine Unfälle mehr durch den Webschützen vorgekommen. Überhaupt sind Unfälle sehr selten. Der Werkmeister der Feinspinnerei berichtete, daß während der 15 Jahre, die er seiner Abteilung vorsteht, nur ein Unfall vorgekommen sei.

Schädigend kann die Arbeit während der Schwangerschaft wirken. Fehlgeburten, vor allem Frühgeburten sind bei den Arbeiterin-

nen der Textilindustrie häufiger als bei anderen Frauen. Einige der Untersuchten klagten über schwierige Geburten. Man muß bedenken, daß die Frauen ihre Tätigkeit meist bis kurz vor der Entbindung ausüben und außer ihrer Berufsarbeit auch noch mit Hausarbeit belastet sind.

Überblick über die Gesundheitschädigungen, die in der Schneiderei auftreten können.

Arbeitsmaterial.

Zwei Fälle von Urticaria fand ich, die auf das Arbeitsmaterial, den Lodenstoff, zurückgeführt wurden. Dazu möchte ich die Beobachtung von *Urbach* anführen: „Schafwoll-Allergie ist nicht so selten, wie im allgemeinen behauptet wird. Sie findet sich nicht nur bei Personen, die mit Rohmaterial zu tun haben, sondern auch bei Trägern von Wollfäcken und sind der Quell mancher Urticaria.“

Verarbeitung.

Bei der Verarbeitung des Stoffes kann es vor allem bei den Handnäherinnen durch Stichverletzungen zu Entzündungen kommen. Auch die Zuschneidemaschinen können Fingerverletzungen hervorrufen. Die Büglerinnen sind dem Dampf, der beim Bügeln entsteht, und Verbrennungen ausgesetzt.

Die Arbeitsweise.

Das Sitzen begünstigt Magen- und Darmstörungen. Vor allem Obstipation, Unterleibsleiden, Blutzirkulationsstörungen und vielfach Wirbelfäulenverkrümmung. Wirbelfäulenverkrümmungen und schlechte, zusammengeklunkene Haltung beeinflussen die inneren Organe und disponieren, besonders wenn die Arbeit in schlecht gelüfteten, dicht besetzten Räumen vor sich geht, zu Tuberkulose. Die Räume, die den Arbeiterinnen bei Loden-Frey zur Verfügung stehen, sind geräumig und hell und werden während der Pausen gründlich gelüftet.

Büglerinnen und Einrichtnerinnen können durch das fortwährende Stehen Senkfüße und Krampfadern bekommen. Trotz guter Beleuchtung kann auch hier die Naharbeit zu Sehstörungen, vor allem Myopie, führen. Das Maschinengeräusch kann Kopfschmerzen verursachen.

Die Akkordarbeit ist sehr anstrengend, führt leicht zu Ermüdungserscheinungen, zu nervösen Leiden und Herzbeschwerden.

Ergebnis der Nachfrage:

12 der Untersuchten führten Herzbeschwerden und 3 Nervosität auf die aufreibende Berufstätigkeit zurück. 2 gaben an, daß das dauernde Sitzen Kreuzweh hervorrufe. 23 klagten über Magen- und Darmstörungen infolge des ständigen Sitzens. 1 Büglerin wies Krampfadern auf. An Kopfschmerzen litten 29 der Untersuchten. 3 gaben an, blutarm zu sein. Ich fand hier nur einen Fall von Bronchitis. Eine Schneiderin gab an, einige Male eine hartnäckige Lungenentzündung durchgemacht zu haben. Ich mußte mich hier wieder auf die Angaben der Untersuchten verlassen. Ungenauigkeiten lassen sich deshalb nicht vermeiden.

Der Gesundheitszustand der Schneiderinnen, überhaupt der Belegschaft der Firma Loden-Frey scheint verhältnismäßig gut zu sein. Das bestätigt die Angabe des Lohnbüros, das verhältnismäßig wenig Krankheitstage feststellen konnte.

Der Zustand der Zähne und der Mundhöhle.

Ich habe den Zusammenhang zwischen Arbeitsprozeß und allgemeinen Gesundheitsstörungen umrissen. Nun will ich über die Zahn- und Mundverhältnisse berichten und sehen, ob sich auch hier ein Zusammenhang zwischen den schädigenden Faktoren, die beim Arbeitsprozeß auftreten und meinen Untersuchungsergebnissen, die ich in einer Statistik zusammengefaßt habe, ergibt. Es ist schwer, diese Frage eindeutig zu beantworten. Man ist sich heute darüber klar, daß die Ursache bei Karies, Gingivitis und Alveolarpyorrhoe, den am häufigsten auftretenden krankhaften Erscheinungen der

Mundhöhle mannigfach sind, und daß es schwierig ist zu entscheiden, welche der möglichen Ursachen im einzelnen Fall anzuschuldigen sind.

Ich will nun kurz eine Erläuterung zu den Symptomen, die allgemein und auch bei meinen Untersuchungen am häufigsten auftreten, geben.

Karies.

Die Karies ist in den letzten Jahrzehnten erschreckend stark aufgetreten. Dieses ist deutlich aus der folgenden von *Lehmann* und *Mummary* aufgestellten Statistik zu lesen:

Steinzeit	2,9% Karies
Bronzezeit	21,8% Karies
4. bis 5. Jahrhundert	70,3% Karies
11. bis 13. Jahrhundert	75,8% Karies
18. bis 19. Jahrhundert	72—78% Karies

Die Prozentzahl wird zurzeit mit 95—98% nach *Howe* angegeben.

Immer wieder hat man versucht, die Ätiologie der Karies klar zu stellen. Doch das ist bis heute noch nicht eindeutig gelungen. Grundlegend ist die chemisch-parasitäre Theorie, die *Miller* 1884 aufgestellt hat. Karies kommt dadurch zustande, daß aus retinierten Kohlehydraten vor allem Polysacchariden, die durch das Ptyalin des Speichels in Maltose zerlegt werden, durch Bakterieneinwirkung Milchsäure gebildet wird, die das Schmelzoberhäutchen angreift und zerstört. Die Bakterien dringen in die Hartsubstanz: Schmelz-Dentin vor und vernichten sie durch ihre entkalkende und proteolytische Tätigkeit. Dies ist der lokale Vorgang. Über die Grundursache der Disposition sind auf Grund von Einzeluntersuchungen viele Theorien aufgestellt worden.

Karies bezeichnet als Nebenursache für die dauernde Zunahme des Gebißverfalls bei den heutigen Kulturvölkern: Veränderte Lebensbedingungen, vernachlässigte Kauarbeit, fortschreitende Individualisierung, die auch die Frau erfaßt und die Stillsitigkeit ungün-

ftig beeinflusst, Wohnungsnot und Unterernährung, unzweckmäßige vitaminarme Ernährung.

Bis heute ist man noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Erkannt hat man, daß die Ätiologie sehr kompliziert verbunden ist mit dem regelmäßigen bzw. krankhaften Ablauf der Lebensfunktionen, überhaupt ein Ausdruck gestörter Funktionen ist. Man nimmt die Karies heute nicht mehr als unabänderliche Tatsache hin, sondern als Warnung und ist bemüht, den Zahnverfall aufzuhalten. Ein weiteres Fortschreiten würde letzten Endes den Untergang des Gesamtorganismus bedeuten.

Zahnstein.

Unter Zahnstein verstehen wir Kalkablagerungen aus dem Speichel, bevorzugt am Zahnhals in der Nähe der Speicheldrüsen. Die Keimwirkung des Zahnhalles, der ja auch aus einem Gemenge von Kalziumkarbonat und -Phosphat besteht, veranlaßt die Kalkausfällung aus der nach *Sachs* mit Kalziumkarbonat und -Phosphat überfüllten Speicheldrüsenabsonderung. Der Zahnstein setzt sich zusammen in der Hauptsache eben aus Kalziumkarbonat und -Phosphat, Speiseresten, Epithel, Muzin, Fett und Eiweißstoffen. *Kranz* gibt an, daß 80% aller Menschen Zahnsteinablagerungen aufweisen.

Gingivitis.

Unter Gingivitis verstehen wir eine Entzündung des Zahnfleisches, die meist durch exogene, jedoch begünstigt durch endogene Faktoren, hervorgerufen wird. *Kranz* sagt: „Das Zahnfleisch und die Mundschleimhaut gehören zu den feinsten Indikatoren, sowohl bei Allgemeinerkrankungen wie bei örtlichen Krankheitsvorgängen der Mundhöhle.“

Ich will einige der möglichen Ursachen nennen: Überstehende Kronenringe, unzweckmäßige Brücken, Füllungen und Prothesen, vernachlässigte Mundpflege, ferner chemische Stoffe und Bakterien. Unterstützend wirken Chlorose, Ernährungsstörungen allgemeiner Art und auch der Schleimhaut, Mangelkrankheiten und auch hormonale Störungen.

Ich habe vorwiegend die einfache Gingivitis, die Gingivitis simplex oder marginalis vorgefunden. Sie beginnt meist damit, daß sich ein weißer Belag aus abgeschliffenen Epithelien, Speiseresten und Bakterien auf dem Zahnfleisch bildet. Der Reiz verursacht Rötung und Schwellung und starke Blutungsbereitschaft des Zahnfleisches.

Die Alveolarpyorrhoe.

Klinisch wird meist unterschieden zwischen der unter primärer Auflösung des Alveolarfortsatzes vor sich gehenden Paradentose und der Paradentitis, wo ein Epitheldefekt, häufig verursacht durch Zahnstein, Eiterung, Taschenvertiefung und Knochenumbau bewirkt. Auch hier bestehen zwischen den lokalen Erscheinungen und dem Organismus Wechselbeziehungen. Begünstigt wird das Auftreten der Alveolarpyorrhoe durch Stoffwechselstörungen, veränderte Kapillarverhältnisse, Dysfunktion der Drüsen und allgemeine Krankheiten; als äußerer Faktor spielt die Störung des Artikulationsgleichgewichts, die sich meist als Überbelastung äußert, eine bedeutende Rolle.

Ich fand fast ausschließlich Paradentitis, gekennzeichnet durch mehr oder weniger starke Zahnsteinablagerung, meist blaurotes, oft gewulstetes Zahnfleisch, tiefe Taschen, oft bis $\frac{1}{2}$ cm tief und darüber, gelockerte Zähne, Wanderung der erkrankten Zähne mit Austritt von gelblich-weißem Eiter.

Die Untersuchungsergebnisse.

Alle Arbeiterinnen wiesen ausnahmslos Karies auf, zum Teil in erschreckendem Ausmaß.

Zahnstein impaktierte in dünnen, oft aber auch in beachtlichen Schichten vorwiegend die Frontzähne von 174 = 56% der Untersuchten. Gingivitis meist in Form einer Gingivitis-marginalis war häufig: in 130 Fällen = 42%.

Alveolarpyorrhoe und zwar fast ausschließlich die entzündliche Form, wiesen 69 Arbeiterinnen auf = 22%.

Vorhanden waren im Ganzen 7083 Zähne; bei idealem Zahnbestand, d. h. pro Person 32 Zähne, hätten 9920 Zähne da sein müssen. Demnach fehlen 2832 Zähne — 29%. Im Durchschnitt fehlen pro Person 9 Zähne. Dazu kommen als funktionsuntüchtige Zähne diejenigen, die bis zur Wurzel zerstört sind, insgesamt 168 — 2%; im Durchschnitt 0,5 pro Person und als funktionsminderwertige 699, teils mehr, teils weniger kariöse Zähne — 10%, im Durchschnitt 2. 1463 Zähne — 20% oder 5, im Durchschnitt waren gefüllt, die meisten mit Amalgam, sehr viele mit Silikatzement, die übrigen mit Zement, ganz wenige mit gegossenen Füllungen.

Unter Kronen habe ich zusammengefaßt: Metallkronen, die vorwiegend aus Gold bestanden, Stiftzähne und Logankronen. Ich zählte 218 Kronen — 1,3% und 38 : 2 — und mehrgliedrige Brücken.

4 Personen trugen oben und unten Totalersatz, die anderen 16 totalen Prothesen ersetzten entweder die Zähne des Oberkiefers oder die des Unterkiefers.

Das Alter der untersuchten Arbeiterinnen bewegt sich zwischen 17—64 Jahren. Das Durchschnittsalter beträgt fast 35 Jahre.

22 Arbeiterinnen gaben an, Rachitis durchgemacht zu haben. Bestätigt wurden die Angaben durch Hypoplasien, V-förmige komprimierte Kiefer mit hohem Gaumen. Dazu kommen noch 3 mit ausgesprochenem offenem Biß. 3 Personen wiesen eine Prognathie auf, 2 Arbeiterinnen mit Progenie konnte ich feststellen. Kreuzbiß fand ich in 6 Fällen. 4 Arbeiterinnen hatten eine Lingua plicata.

Von den fehlenden 2832 Zähnen sind 862 durch Prothesen und 61 durch Brückenglieder ersetzt. 1914 Zähne blieben unersetzt. Nicht nur sie, sondern oft auch ihre Antagonisten fallen weg beim Kauakt, pro Person also im Durchschnitt mindestens 6.

Der Einfluß des Wollstaubs in der Tucherei auf Zahn- und Mundkrankheiten.

Nicht ohne Einfluß wird der Wollstaub, der in mehr oder weniger großen Mengen während des Arbeitsganges entsteht, beim Auftreten der angeführten Zahn- und Zahnfleischerkrankungen sein.

Inwieweit er eine Rolle spielt, läßt sich nicht einwandfrei feststellen, da zu viele Faktoren als Ursachen zusammenwirken.

Eine Einwirkung ließe sich etwa folgendermaßen erklären: Der Staub setzt sich auf Schleimhaut und Zähnen fest. Bei ungenügender Mundpflege können die Beläge die Entföhung der Karies fördern. Die mit kleinen Widerhäkchen versehenen Wollfasern können die Schleimhaut reizen und so zur Ursache einer Gingivitis meist leichter Natur werden. Zahnstein, begünstigt durch den Staub, kann zu Alveolarpyorrhoe föhren. Es handelt sich also lediglich um eine mechanische Wirkung des Staubes. Damit stimmen überein Angaben von *Mooser* in seiner Dissertation. Er schreibt von Staubgingivitis, Lymphdrüfenschwellung und pyorrhoeartigem Zustand mit Lockerung der Zähne bei Textilarbeitern.

Vergleicht man die gefundenen Zahlen für die Tucherei mit denen für die Schneiderei, dann kann man wohl eine ziemliche Übereinstimmung in den Zahlen für Zahnstein, der allerdings bei den Untersuchten der Tucherei meist in dickeren Schichten angelagert war, und Gingivitis feststellen. Erheblich ist der Unterschied der Zahlen für das Auftreten der Alveolarpyorrhoe. Außerdem stehen 12 im Durchschnitt fehlenden Zähnen der 1. Gruppe, 7,6 der 2. Gruppe gegenüber. Die Anzahl der kariösen Zähne bewegt sich im gleichen Rahmen, während gefüllte Zähne bei den Schneiderinnen überwiegen. Total- und Teilerfatz sind häufiger bei der ersten Gruppe; beide auffallend häufig in der Weberei zu finden. Bei diesen Angaben ist zu berücksichtigen, daß das Durchschnittsalter bei der ersten Gruppe, vor allem bei den Weberinnen bis zu 10 Jahren höher liegt.

Einfluß der Nadeln und Fäden in der Schneiderei.

Bei den Schneiderinnen finden wir eine berufsspezifische Zahnschädigung meist geringfügiger Natur, hervorgerufen durch gewohnheitsmäßiges Abbeißen der Fäden oder durch das Halten von Näh- oder Stecknadeln zwischen den Zähnen. Durch diese ständige kleine mechanische Einwirkung entstehen längs der Schneidefläche der vor-

deren Zähne schlielförmige Einschnitte oder kleine halbmondförmige Ausbuchtungen. Defekte dieser Art fand ich bei 13 Schneiderinnen. In einigen Fällen schien es zu Pulpennekrose gekommen zu sein. Weitergehende Schädigungen konnte ich nicht beobachten. Gerade bei den unteren Zähnen besteht besonders die Möglichkeit der Pulpennekrose, weil die Pulpenkammer sehr eng ist, und die Pulpa daher auf mechanische Reize besonders stark reagiert. *Bielstein* erwähnt in seiner Dissertation einen Fall, wo infolge gewohnheitsmäßigen Durchbeißens von Fäden sich bei einer Schneiderin eine multiple Ostitis des Unterkiefers ausgebildet hatte, die lange Zeit jeder Behandlung spottete. *Williger* fand die üble Angewohnheit als Ursache einer Kinnfistel. Durch den dauernden Reiz war die Pulpa des unteren seitlichen Schneidezahns abgestorben. Auch in einigen anderen Fällen hat *Williger* infolge des Absterbens der Pulpa durch Trauma sehr schmerzhafte und hartnäckige Wurzelhautentzündungen beobachtet.

Die meisten Schneiderinnen bei Frey arbeiten mit der Maschine und kommen so weniger in Versuchung, die Fäden abzubeißen oder Nadeln zwischen den Zähnen zu halten.

Seit wann werden die Zähne schlecht?

Auf diese Frage erhielt ich im allgemeinen ungenaue Antworten. Die meisten gelandeten, daß sie eigentlich garnicht darauf geachtet hätten. Zudem ist der Begriff „schlecht“ weit. Man staunt immer wieder, welche Unkenntnis und welche komischen Ansichten in Bezug auf die Zähne bestehen. Die Zähne können ruhig kariös sein, solange sie keine besonderen Schmerzen verursachen, sind sie in den Augen der meisten Untersuchten gut.

Mehrere Frauen wiesen darauf hin, daß ihre Zähne durch die Schwangerschaft bedeutend schlechter geworden seien. Die Steigerung der Karies durch die Schwangerschaft ist eine umstrittene Frage. *Kranz* behauptet sie. Nach ihm kommt sie zustande durch veränderte Drüsentätigkeit und ihren Einfluß auf den Gesamtstoffwechsel und damit auf die Zähne. Vor allem tritt eine Änderung des Kalkstoff-

wechsels ein, der bei der Mutter zugunsten des Kindes eine Kalkverarmung hervorruft, die, wenn kein Ausgleich durch entsprechende Ernährung stattfindet, sich in einer Schwächung von Dentin und Schmelz äußert und so die erhöhte Disposition für Karies gibt.

Zahnpflege.

2 Arbeiterinnen gaben an, nie die Zähne zu putzen, 3 reinigten sie selten, 7 ab und zu, 2 tun es einmal in der Woche, 11 öfter in der Woche, die übrigen 284 Untersuchten putzen regelmäßig ein- bis zweimal am Tage die Zähne. In manchen Fällen werden die Angaben nicht ganz ehrlich fein, aber viele, vor allem die jüngeren und da besonders die Schneiderinnen scheinen auf Sauberhaltung ihrer Zähne zu achten.

Gerade die Mundpflege ist von besonderer Wichtigkeit als prophylaktische Maßnahme gegen schädigende Einwirkungen durch zersetzte Speisereste, aber auch durch Staub, dem die Menschen ausgesetzt sind. Die Möglichkeit einer Staubschädigung kann auf ein Minimum beschränkt werden, wenn regelmäßig und vor allem richtig Zahnpflege getrieben wird. Viele nehmen an, daß Spülen mit Wasser oder irgendeinem Mundwasser genüge. Die chemisch-antiseptische Wirkung der Spülmittel ist unweifellich. Wichtiger ist es, die Zähne rein mechanisch von Belag und Speiseresten zu befreien. Am Tage ist den Arbeiterinnen, die meist ununterbrochen, auch während der Mittagspause im Betrieb bleiben, kaum Gelegenheit dazu gegeben. Doch sollte umso gründlicher abends vor dem Schlafengehen daran gedacht werden, damit die Zähne nicht über Nacht schädigenden Einwirkungen von Belag ausgesetzt sind. In dieser Hinsicht leistet die Schulzahnpflege wertvolle Anregung. Seit der Kindheit putzen ihre Zähne 147 Personen, seit der Schule oder Lehrzeit 119, im späteren Alter haben damit begonnen 26 Personen.

Doch gehört nicht nur fachgemäßes Putzen, sondern auch ein regelmäßiger Besuch des Zahnarztes zur richtigen Mundpflege. Damit sieht es weniger gut aus. Das zeigen die Angaben, aus denen hervorgeht, daß die meisten Untersuchten nur dann den Zahnarzt aufsuchen, wenn ein Zahn Schmerzen verursacht. Diese Angabe wird

bestätigt dadurch, daß ich außer ziemlich zerstörten Zähnen 168 Wurzelstümpfe fand. Auf meine Aufforderung, sie zu extrahieren, bekam ich fast jedesmal die verständnislose Antwort, solange sie nicht weh tun, bleiben sie im Mund.

Ich habe versucht, den Leuten klar zu machen, welchen Gefahren sie sich aussetzen. Man hat in den letzten Jahren die große Bedeutung erkannt, die die Zähne als Infektionsherd bilden. Bakterien und ihre Toxine können entweder von apikal durch kariöse Zähne oder auch von marginal ausgehend von tiefen Taschen in Blut- und Lymphbahnen eintreten und so unmittelbare oder sekundäre Krankheiten hervorrufen. *Citron* faßt die möglichen Krankheitsbilder zusammen in:

1. Krankheitsbilder die durch direkte Wirkung der Bakterien oder durch deren Gifte entstehen können.
2. Anaphylaktische Krankheitsbilder mit lokalen und allgemeinen Anaphylaxiesymptomen.
3. Allgemeine Infektionslympome.
4. Störungen des Verdauungstrakts.
5. Stoffwechselstörungen.
6. Störungen des endokrinen Apparates und der Psyche.
7. Hauterkrankungen.

Misch sagt, daß „die versteckten und offenen oralen Infektionsherde sicherlich schon jetzt viel mehr Arbeitstage der werktätigen Bevölkerung rauben und indirekt deren Arbeitskraft viel stärker mindern, als mangels Erkennung der Ursachen mancher Erkrankungen in die Erscheinung tritt und sich so zahlenmäßig auswirkt“.

Eine der Untersuchten war noch nie beim Zahnarzt, die meisten suchten den Zahnarzt dann erst auf, wenn sie Schmerzen haben, doch geht auch eine große Anzahl regelmäßig zum Zahnarzt. Eine Arbeiterin läßt jeden Monat ihre Zähne nachsehen, eine andere alle zwei Monate, 29 lassen den Zustand ihrer Zähne dreimal im Jahre kontrollieren, 25 nehmen den Zahnarzt zweimal im Jahre in Anspruch, 25 besuchen den Zahnarzt einmal im Jahre. Eine der Untersuchten läßt alle zwei Jahre einmal nachschauen.

In der Hauptsache sind es die Schneiderinnen, die verhältnismäßig regelmäßig den Zahnarzt aufsuchen. Es wäre anzustreben, daß der übrige Teil der Belegschaft den Kolleginnen folgte und jedes halbe Jahr den Zustand der Zähne überprüfen ließe. Auch da setzt die Tätigkeit der Schulzahnpflege ein und bewirkt eine Besserung. 137 gaben an, schon als Schulkind beim Zahnarzt gewesen zu sein, jedoch die meisten lediglich zur Extraktion.

Wovon ernähren sich die untersuchten Arbeiterinnen in der Hauptsache?

Die Frage, ob und inwiefern ein Zusammenhang zwischen Ernährung und Zahnverhältnissen besteht, ist in den letzten Jahren besonders akut geworden. Auf dem Fragebogen wurde daher auch danach gefragt, was vorwiegend gegessen wird. Die einzelnen Zahlen sind in der Tabelle nachzulesen. Von über zwei Dritteln der Belegschaft wird Hausmannskost gegessen. Man versteht darunter in Bayern: Suppe, verhältnismäßig viel Fleisch, wenig Kartoffeln und Gemüse, am Freitag eine Mehlspeise. 32 gaben allerdings besonders an, daß sie nicht bevorzugt Fleisch, sondern ihrer finanziellen Lage Rechnung tragend, meist Gemüse und Kartoffeln essen. Es folgten 61 die sich hauptsächlich von Fleischkost ernähren und zwar fällt auf, daß davon nur 39 auf die Schneiderinnen entfallen. Ihrer Arbeitsweise ist eine vorwiegende Fleischkost nicht zuträglich. Dafür finden wir in ihren Reihen 3 Vegetarier, die allerdings, teils auf Grund von Magen- und Darmstörungen zur vegetarischen Kost übergegangen sind. 36 Arbeiterinnen bevorzugen Mehlspeisen, davon ist der Hauptanteil im Schneiderinnengewerbe tätig. Viel Süßigkeiten zu essen, gaben 8 Arbeiterinnen zu. Alkohol wird nur, in den für Bayern üblichen Mengen genossen. Fette Speisen werden bevorzugt von 10 der Untersuchten.

Wir sehen, daß Fleisch die Hauptrolle in der Ernährung spielt. Danach werden verhältnismäßig viel Mehlspeisen gegessen. Es ist das typische Bild, daß sich immer wieder bei Rundfragen ergibt.

Eine große Rolle spielt dabei natürlich die finanzielle Lage der Arbeiter.

Ich habe diesen Fragen noch die Frage nach dem Brot, das vorwiegend gegessen wird, angegeschlossen. Eine der Untersuchten gab an, selbstgebackenes Brot zu essen, eine bevorzugte Vollkornbrot, eine andere ißt ausschließlich Schlüterbrot und eine nur Knäckebrötchen. Einige wenige noch essen vorwiegend Roggenbrot. Die übrigen Arbeiterinnen essen meist dunkles oder helles Hausbrot oder Milchbrot; viele Schneiderinnen vor allem bevorzugen Weißbrot. Sie gaben an, sie könnten dunkles Brot nicht vertragen.

Allgemeines über die Ernährung und ihre Beziehung zu Karies und Alveolarpyorrhöe.

Forschungen von Roesse, Rangnar Berg, Bircher-Benner, E. und M. Mellanby, Euler, Stepp und Kollath haben ergeben, daß die Grundursache der fast 100%igen Kariesanfälligkeit in der durch Zivilisation und Technik bedingten Ernährungsweise des Menschen der Jetztzeit zu suchen ist. Die Ernährung verursacht wohl eine Störung des kolloidalen Gleichgewichts, die sich ebenso wie im ganzen Organismus auch im Zahnsystem auswirkt.

Eine bedeutende, aber nur sekundäre Rolle wird der chemisch-bakteriologischen Kariestheorie von Miller beigemessen.

Nach Klusmann wirkt sich die Ernährung folgendermaßen aus:

- a) Schädigungen, die eine Herabsetzung der Widerstandskraft herbeiführen: der mangelhafte Aufbau des Zahns infolge falscher Ernährung, insbesondere der Auswirkung der Mangelkrankheiten, ferner infolge fehlerhaften Arbeitens der Drüsen innerer Sekretion, das auf vererbter Anlage wie auch auf falscher Ernährung beruhen kann. Kurz alles, was auf dem Umweg über die Körperflüssigkeiten auf das Gebiß Einfluß hat, wobei sich die Ernährung auf kurzen und langen Wegen auswirken kann.
- b) Schädigungen, die eine Verstärkung der angreifenden Kräfte zur Folge haben: mangelhafte Selbstreinigung infolge zu

weicher Nahrung, die nicht genügend zum Kauen zwingt, die geringere Abfonderung von Speichel, die vermehrte Säurebildung, die mangelhafte Pflege.

Beide Gruppen gehen in einander über und arbeiten sich Hand in Hand.

Schädigungen, die eine Herabsetzung der Widerstandskraft herbeiführen.

Werden Eiweiß, Kohlehydrate, Fett, die Vitamine und Mineralstoffe in harmonischem Verhältnis dem Körper zugeführt, dann gewähren sie den normalen Ablauf der Lebensfunktion. Vor allem von Wichtigkeit ist die Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts des Blutes. Nahrung jedoch, in deren Mittelpunkt der Fleisch- und Zuckerverbrauch steht, führt zur Überfäuerung der Körperflüssigkeiten. Nach *Bircher-Benner* ist der Fleischverbrauch in den letzten Jahrzehnten um das Vierfache, der Zuckerverbrauch um das Neunfache gestiegen. Alle Nahrungsmittel tierischer Herkunft, außer Blut, Kraftbrühe und Milch, außerdem auch reichliche Zufuhr von Kohlehydraten in Form von raffiniertem Zucker und feinen Mehlsorten, können zu Säureüberschuß führen. Dagegen haben pflanzliche Nahrungsmittel durchweg Basenüberschuß, der durch Kohlensäure neutralisiert wird. Eine allzu starke Säurezufuhr zwingt den Organismus, außer den Mitteln, die ursprünglich zur Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts dienen, wie Alkalität des Blutes, Ausscheidung durch Darm, Nieren und Atmung und die in der Nahrung befindlichen Basen, auf die Reservedepots zurückzugreifen und zwar auf das im Körper vorhandene Eiweiß, aus dem zur Neutralisation Ammoniak gebildet wird, und — was für meine Ausführungen von Wichtigkeit ist — auf den Kalk des Knochens und damit auch des Zahnsystems.

Die Vitaminfrage.

Wichtig im Ernährungsproblem sind die akzessorischen Nährstoffe; vor allem auch in Bezug auf die Karies- und Parodontose-

Ätiologie sind Vitamine in Verbindung mit den Mineralsalzen vor allem Kalzium und Phosphor von Bedeutung. Dieser Fragenkomplex ist allerdings noch sehr umstritten. Ich will daher nur kurz darauf eingehen.

Der Einfluß der Ernährung wirkt sich besonders aus auf den wachsenden Zahn, also schon vor der Geburt und während der ersten Lebensjahre. Ernährungsstörungen der Mutter wirken sich wie schon erwähnt, nicht nur an ihren eigenen Zähnen, sondern auch an den Zähnen des Kindes aus.

Euler ordnet die Vitaminwirkung für die Verkalkung nach Zeit und Wirkungsweise wie folgt:

1. Intrauterin: Vitamin C, A, B, D.
2. Säugling: Vitamin D, C, A.
3. Zeit bis zur 2. Dentition:
 - a) für die Milchzähne alle Vitamine,
 - b) für die bleibenden Zähne: Vitamin C, D, A.
4. Zeit bis zum Abschluß der 2. Dentition D, A, C.
5. Für die weitere Funktionszeit: Phosphor und Mineralsalze.

Vitamine A- u. D-Mangel wird von *M. Mellanby* verantwortlich für paradentale Störungen gemacht.

Bircher-Benner betont, daß außer der Energiemenge auch die Organisation der Energie in Betracht gezogen werden muß. „Daß die im Pflanzenreich aufgebaute Nahrung ihr Wirkungsvermögen biologisch und korrelativ organisierten Licht-Energien verdankt.“

Jede Zustandsänderung führt zu Organisationsverlust, und dieser wieder bedingt minderwertige Nährstoffe.

Gerade in dem Punkt haben Zivilisation und Technik nachteilig gewirkt. Frischnahrung wurde verdrängt durch konservierte Nahrung. Chemische, physikalische und thermische Einwirkungen, darunter auch vor allem die küchentechnische Verarbeitung vernichten die Vitamine und Mineralien durch Kochen, Brühen, Schälen, Lagern und konservierende Maßnahmen. Die künstliche Düngung hat verminderten Kalkgehalt in Gemüse, Obst und Salat zur Folge.

Die Molkereiprodukte werden vitaminarm durch Stofffütterung. So zerstören Fortschritte der Technik natürliche biologische Werte der Nahrungsmittel.

Schädigungen, die eine Verstärkung der angreifenden Kräfte bewirken:

Da wird vor allem der Konsistenz der Nahrung große Bedeutung zugeschrieben. Auch hier wirkt sich die verfeinerte Küchentechnik schädigend aus, indem sie häufig, die den Zähnen ursprünglich zuge dachte Arbeit vorwegnimmt. Ungenügende Kauarbeit führt zu ungenügender Selbstreinigung der Zähne, zu verminderter Speichelabfonderung und dadurch auch wieder zu herabgesetzter Reinigung des Gebisses und ungenügender Durchblutung des Zahnfleisches. Sie fördert also in erheblichem Maße das Auftreten der Karies. Hier möchte ich gleich erwähnen, daß dem Spüßpiel große Bedeutung in der Karies-Ätiologie zugeschrieben wird. Er wirkt mechanisch als Spülflüssigkeit und chemisch durch seine rammerallisierende Eigenschaft nach *Türkheim*.

Leisten die Kauwerkzeuge ungenügende Vorarbeit, so kann das natürlich auch die Ursache einer Schädigung des gesamten Verdauungstraktus sein. Man führt darauf die Seilingergastritis, die in immer stärkerem Maße auftretende Darmträgheit, dann auch das Anwachsen der Krebshäufigkeit zurück.

Die Brotfrage.

Von größter Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Brotfrage. Bedenken wir, daß nach Angabe von *Flössner* in Deutschland 40% des Nahrungsbedarfs durch Brot und Mehl gedeckt werden. Das Brot, das heute vorwiegend gegessen wird, ist frisch, pappig, dünnrindig und schmeckt fade. Bevorzugt wird Weißbrot. Zudem wird Brot sehr viel durch Kuchen und Gebäck verbannt. Brot und Backwerk bedingen nur eine ganz minimale Kautätigkeit. Damit geht verminderte Selbstreinigung und Speichelabfonderung einher. Es kommen noch kariesfördernde Faktoren hinzu, bedingt durch die

Klebrigkeit des Brotes und den Zuckergehalt der Backwaren. Gefährlich ist der Zuckergehalt wegen seiner endogenen kalkentziehenden Wirkung, dann als Medium für die Bakterien, die Milchsäure daraus bilden.

Was den Gehalt des Brotes betrifft, so hat auch da die technische Verarbeitung zur weitgehenden Wertverminderung des Mehls geführt. Der Nährwert des Mehles hängt ab vom Ausmahlungsgrad. Um das Mehl haltbar zu machen, werden Schale und Keimling entfernt. Gerade sie sind Träger der wertvollsten Nährstoffe, nämlich der Mineralien, Kalk, Eisen, Natrium, Fluor und der Vitamine, vor allem Vitamin B und leicht resorbierbarer Eiweißkörper. Die Kleie regt durch ihren großen Zellulosegehalt die Darmtätigkeit in gesunder Weise an.

All die erwähnten Faktoren faßt *Bircher-Benner* in folgenden Worten zusammen: „Der Desorganisationsgrad der zugeführten Nahrung bedingt den Grad der Gleichgewichtsförderung im Aufbau und Betrieb im kolloidalen Gleichgewicht, im hormonalen Gleichgewicht, bedingt je nach seiner Art, Mangel- oder Überschußkrankheit, Acidose oder Alkalose, aplastisch konsumptive oder paraplasiatisch produktive Prozesse, führt zur Minderung der Abwehrkräfte, der Immunität und der hygienetischen Kraft im ganzen System, in der Organe nur je nach ihrer Ansprechbarkeit und in allen Geweben, selbstverständlich auch in den Zahngeweben. Hier findet sich die Ursache der Kariessensibilität der Zähne, die Grundursache der Karies.“

Was für eine Ernährung ist erforderlich?

Die „Maltscheuche“ Karies kann mit Erfolg demnach nur angegriffen werden, wenn eine weitgehende Umstellung der Ernährung erfolgt. Gefordert wird eine vitamin- und mineralstoffreiche, gemischte Kost. Fleisch- und Zuckergenuss soll eingeschränkt werden zu Gunsten von Rohkost, Gemüse und Salat. Zudem soll zweckmäßig ein schmackhaftes, gut ausgemahlenes Roggenbrot mit fester Rinde und zwar erst, wenn es einige Tage gelagert ist, gegessen

werden. Während der Untersuchung wurde auf Veranlassung der NS-Volkswohlfahrt durch ein Plakat besonders auf den Wert des Vollkornbrottes zur Gefunderhaltung der Zähne hingewiesen. Die küchentechnische Bearbeitung hat Rücksicht zu nehmen auf Erhaltung der natürlichen Werte. Vor allem sollte auf zweckmäßige Ernährung während der Schwangerschaft und des Wachsens des Zahns geachtet werden.

Doch eine solche Umstellung wird sich nur erreichen lassen durch unermüdliche Aufklärungsmaßnahmen, die von Arzt und Zahnarzt, von Schule und Behörden ausgehen.

Karies und Vererbung.

Nun noch kurz einige Worte zum Ergebnis der Frage nach Vererbung und Karies. Die Angaben sind davor angedeutet, daß es keinen Zweck hat, sie wieder zu geben. Die Eltern von vielen der Untersuchten sind bereits tot oder können nicht hier. Die übrigen Arbeiterinnen gaben an, daß ihre Eltern Prothesen trugen oder sie waren nicht orientiert. Ungenauheiten unterworfen sind die Angaben über die Zähne der Kinder von. Das letztgenannte Arbeiterinnen haben Kinder und zwar

- 59: 1 Kind
- 18: 2 Kinder
- 13: 3 Kinder
- 1: 4 Kinder
- 1: 5 Kinder
- 1: 6 Kinder

Insgesamt handelte es sich also um 149 Kinder.

Der Zahnzustand ist angeblich bei

- 120 Kindern: gut
- 13 Kindern: schlecht
- 11 Kindern: mittelmäßig
- 5 Kindern: noch keine vorhanden.

Von den 98 Müttern war der Zustand der Zähne bei:

- 1: gut
- 74: schlecht
- 23: mittelmäßig.

Die Vererbungsfrage bei der Karies harret auch noch der endgültigen Lösung. *Bischer-Berner* erklärt Jara: „Der Erbfaktor spielt bei der Karies dieselbe Rolle wie bei vielen anderen Ernährungskrankheiten.— — —Desorganisierte Nahrung schädigt auch das Keim-plasma derart, daß die 1. Generation alimentären Schadenfaktoren in der 2. Generation rascheren Erfolg zeigen.“

Zusammenfassung.

Meine Untersuchungen haben ergeben, daß der allgemeine Gesundheitszustand verhältnismäßig gut, dagegen die Zahn- und Mundverhältnisse schlecht, zum Teil katastrophal sind. Ich habe versucht zu zeigen, was für ein komplexer Vorgang die Zahnkaries ist, daß es unmöglich ist, einen Faktor als Ursache anzugeben. Zahnkaries und ebenso die Alveolarpyorrhoe sind stets die Folge mehrerer zusammenwirkender Momente. Als begünstigenden Faktor, doch wohl nur in geringem Maße, können wir die Staubwirkung, der die Arbeiterinnen in der Tinktur ausgesetzt sind, annehmen. Die Untersuchungen zeigen ferner, daß noch viel Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Zähne und ihre Krankheiten geleistet werden muß. Viel verdanken wir schon der Schulzahnpflege an Aufklärungsarbeit, Prophylaxe und allgemeiner Zahnpflege. Es wäre zweckmäßig, wenn die Ernährungsfragen und ihr Einfluß auf die Karies mehr betont würden.

Herrn Dozent Dr. med. et. phil. Schmidt-Lange möchte ich meinen besonderen Dank für die Überlassung des Themas, für wertvolle Anregungen und die Übernahme des Referats aussprechen.

I. Ergebnis der Untersuchung der Mundhöhle.

Abteilung	Anzahl der Arbeiter	Durchschn.-Alter	Anz. d. untersuchten Zähne	Ges.-Zahl d. kariös. Zähne	Durchschn.	Anzahl der Wurzelreste	Gesamtz. d. Füllungen	Durchschn.	Gesamtz. d. Kronen	Gesamtz. d. Brücken	Totalersatz	Teilersatz	Alveolarpyorrhoe	Zahnstein	Gingivitis	Gesamtzahl d. fehlenden Zähne	Durchschn.
1. Tucherei Kremperei	13	35	245	18	1.4	10	53	4.1	8	1	3	6	6	7	6	171	12.2
Spinnerei	22	34.6	421	35	1.5	13	98	4.5	16	2	5	6	10	13	11	283	12.8
Weberei	39	39.4	688	69	1.8	10	106	2.7	26	6	8	11	12	36	13	560	14.1
Zettlerei	8	36.1	175	28	3.5	5	29	3.5	1	1	—	3	2	4	5	81	10.1
insgesamt	82	36.2	1529	148	2.5	38	286	3.7	51	10	16	26	30	50	35	1095	12.3
2. Schneiderei	228	28.8	5554	551	2.4	130	1177	5.2	167	28	8	25	39	124	95	1737	7.6
1 + 2 insgesamt	310	34.8	7083	699	2.5	168	1463	4.4	218	38	24	51	69	174	130	2832	10

II. Ernährung.

Abteilung	Vege- tarier	vor- wiegend Fleisch- kost	Süßes	viel Mehl- speisen	Fett	Haus- mann- kost
1. Tucherei: Krempelei	—	6	—	2	—	6
Spinnerei	—	4	—	2	—	17
Weberei	—	12	2	3	1	23
Zettlerei	—	—	1	1	—	8
insgesamt	—	22	3	8	1	54
2. Schneiderei	3	39	5	28.	9	156
1 + 2 insgesamt	3	61	8	36	10	210

Literatur-Angabe.

- Albrecht Dr. H.*: Handbuch der praktischen Gewerbehygiene mit besonderer Berücksichtigung der Unfallverhütung. 1896.
- Bircher-Benner, Dr. med. M.*: Ernährungsprophylaxe der Zahnkaries. D.Z.W. 1936 Nr. 42.
- Bradke, F.*: Temperatur und Feuchtigkeit in dichtbesetzten Räumen. Zentralblatt f. d. gef. Hygiene. 1935. Bd. 36.
- Gottstein, Schlossmann, Telecki*: Handbuch der sozialen Hygiene u. Gefundheitsfürsorge.
- Klussmann, W.*: Gebißverfall und Ernährung.
- Koelsch, F.*: Die Textilindustrie und ihre gewerbemedizinische Bedeutung. Med. Welt 1935. S. 959—963.
- Physiologie und Hygiene der Arbeit. 1931.
- Handbuch der Berufskrankheiten 1. u. 2. Band.
- Kranz, Prof. Dr.*: Klinische Zahnheilkunde und ihre Grenzgebiete.
- Misch, J.*: Zahnärztliche soziale Hygiene 1930. Band VI.
- Mooser, Hans*: Dissertation über die gewerblichen und nichtgewerblichen Schädigungen der Zähne. Erlangen 1934.
- Schrickel, Dr. E.*: I. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Kariesforschung und Kariesbekämpfung. D.Z.W. 1936. Nr. 25, 31, 36.
- Stärke, Dr. med.*: Allgemeine Kausalthherapie der Parodontose. D.Z.W. 1936. Nr. 46.
- Steiner, Dr. Otto*: Biologisches Denken und Handeln in der exakten wissenschaftlichen Medizin, Homöopathie, Naturheilkunde, Ernährungstherapie, Pflanzenheilkunde, Spagyrik, Biochemie und Psycho-Therapie. D.Z.W. 1936. Nr. 52.
- Syrup, Dr. Fr., Geh.Reg.Rat*: Handbuch des Arbeiterschutzes und der Betriebsicherheit. II. und III. Band.
- Telecki*: Zentralblatt für die gesamte Hygiene. 1936. Bd. 36.
- Urbach, Dr. E.*: Klinik und Therapie der allergischen Krankheiten. 1935.
- Vogelsang, Dr.*: Die Verhandlung über Ätiologie und Behandlung der Karies auf dem internationalen Kongreß in Wien. D.Z.W. 1936. Nr. 45.
- Williger*: Zahnärztliche Chirurgie. Leipzig 1915. Zähne und Trauma in „Deutsche Zahnheilkunde in Vorträgen“. Herausgegeben von F. Witzel, Heft 16, Leipzig 1911.

Lebenslauf!

Am 13. 12. 1913 wurde ich als Tochter des Apothekers Hermann Voß in Duisburg geboren. In Oberhausen besuchte ich vier Jahre lang die Volksschule und anschließend 2 Jahre lang das Lyzeum. Die folgenden 4 Jahre verbrachte ich auf der Mädchenschule zu Traben-Trarbach an der Mosel. Die Reifeprüfung bestand ich im März 1933 am Reform-Realgymnasium zu Traben-Trarbach. Mein zahnmedizinisches Studium begann ich in Bonn. Dort legte ich im Sommer 1934 die zahnärztliche Vorprüfung ab. Nach weiterem Studium von 4 Semestern an der Universität in München unterzog ich mich im Herbst 1936 mit Erfolg dem zahnärztlichen Staatsexamen.

